

# CALMABON LIQUID

CHLORINE FREE SPECIAL FERTILIZER / CHLOOR-VRYE SPESIALE MISSTOF

## LIQUID / VLOEISTOF

Nitrogen / Stikstof (N).....	132	g/L	88	g/kg
Calcium / Kalsium (Ca) .....	133	g/L	89	g/kg
Magnesium (Mg) .....	26	g/L	17	g/kg
Boron / Boor (B) .....	2289	mg/L	1526	mg/kg
Molybdenum / Molibdeen (Mo).....	2275	mg/L	1517	mg/kg

SG: 1.5 @ 20°C

## FERTILIZER GRP 1 MISSTOF

Reg. No. / Nr. K5272

Act No. / Wet Nr. 36 of / van1947

## GENERAL INFORMATION

It is generally accepted that the ratio between calcium and magnesium in the soil and plant should be a cation composition of 65 % to 25 % on a millequivalent % basis.

**CALMABON LIQUID** is ideally suited to meet these requirements.

An excess of calcium may result in a boron deficiency. The boron in **CALMABON LIQUID** will solve this problem.

**IMPORTANT:** Before applying this fertilizer, consult a qualified agronomist or agricultural advisor on the necessity of using it.

## DIRECTIONS FOR USE

### Instructions:

- Foliar feeding : Mix 5 litres with 200 litres of water.
- Aerial spray : 5 litres/30 litres of water.

- Micro- and Drip irrigation:

CROP	APPLICATION		REMARKS
	No. of	L/ha	
Apples	4	6	Apply just before first flower drop.
Vegetables	3	3	Apply just before and during fruit formation.
Potatoes	3	3	Apply just before tuber formation.
Tomatoes	3	10	Apply after first flower formation. (Do not over-apply).
Sunflowers	1	3	Apply with first flower formation.

## ALGEMENE INLIGTING

Dit word algemeen aanvaar dat die verhouding tussen kalsium en magnesium in die grond en plante 'n kation samestelling van ongeveer 65 % teenoor 25 % op milliekwivalent % basis moet wees.

**CALMABON LIQUID** is ideaal geskik vir hierdie vereistes.

'n Oormaat kalsium toediening kan boor tekorte veroorsaak. Die hoeveelheid boor in **CALMABON LIQUID** sal hierdie probleem teenwerk.

**BELANGRIK:** Raadpleeg 'n gekwalifiseerde agronoom of landboukundige voordat hierdie misstof toegedien word, oor die noodsaaklikheid van die gebruik daarvan.

## GEBRUIKSAANWYSINGS

### Aanwysings:

- Blaarvoeding : Meng 5 liter met 200 liter water.
- Lugbespuiting : 5 liter/30 liter water.

- Mikro- en Drupbesproeiing:

GEWAS	TOEDIENING		OPMERKINGS
	Aantal	L/ha	
Appels	4	6	Dien toe net voor blomval.
Groente	3	3	Dien toe net voor en tydens vrugvorming.
Aartappels	3	3	Dien toe net voor knolvorming.
Tamaties	3	10	Dien toe net na eerste blomme gevorm het. (Moenie oormatig toedien nie).
Sonneblomme	1	3	Dien toe net voor eerste blomme gevorm het.

Manufactured, Registered & Distributed by /  
Vervaardig, Geregistreer & Versprei deur:



PROPERTIES (PTY) LTD  
Reg. No. 1984/00638/07  
1 Gerard Braak St, Pyramid, 0120  
PO Box 17220, Pretoria North, 0116  
Tel (012) 545 8000 • Fax (012) 545 8088